

NOTULES SUR QUELQUES ORCHIDÉES D'INDO-CHINE. II <sup>1</sup>

Par A. GUILLAUMIN.

PROFESSEUR AU MUSÉUM

Les Orchidées récoltées au Darlac (Annam) par M. PETIT et ayant fleuri à l'établissement Vacherot-Lecoufle à Boissy-Saint-Léger (S.-et-O.) ont déjà fourni des espèces, variétés ou formes nouvelles pour l'Indo-Chine <sup>1</sup>; les floraisons de 1945 ont permis de distinguer l'espèce suivante nouvelle pour la science :

**Cleisostoma ? Petitiana** Guillaum. sp. nov.

*Caulis 5 cm. longa, radicibus crassis, parum ramosis. Folia disticha, linearia ((7 cm. × 1,5 cm.), coriacea, inaequaliter 2-loba, lobis rotundatis, vaginibus longitudinaliter striatis. Inflorescentiae ad caulis basin dense spiciforme racemosae, 10 cm. longae, vaginibus 2, bracteis triangularibus, floribus albis, in labelli lobis antheraeque operculo violaceo notatis. Sepalis : mediano fere orbiculari, fere 2 mm. longo, lateralibus ovatis, paululo majoribus, petalis lanceolato-linearibus, sepalis aequilongis, margine leviter erosis labello 2 mm. longo, 3-lobato, lobis lateralibus leviter falcatis, apice paululo inflexis, 0,25 mm. longis, mediano truncato, rhombeo, 0,75 m. longo, apice leviter inflexo, margine leviter eroso, basi callo pulvinateo, minute papilloso, calcaris ore occludente munito, calcare conico, 0,75 mm. longo, columna brevis, clinandro fer plano, operculo valde convexo, breviter rostrato, pollinibus 2, in fasciola sat brevi, triangulari sessilibus, glandula parva.*

A fleuri à la Maison Vacherot-Lecoufle en juin 1945.

Bien qu'il n'y ait pas de callus postérieur à l'orifice de l'éperon, il semble que cette plante doive être rattachée au genre *Cleisostoma* au voisinage du *C. Poilanei*.

1. Cfr. *Bull. Mus.*, 2<sup>e</sup> sér., XII, p. 351, 1940.